

SPARVIERO

Insecticide polyvalent « suspension de capsules (CS) »

مبيد حشرات متعدد الاستعمالات
"محلول كبسولات"

Composition :

Lambda-Cyhalothrine.....10% p/v (100 g/l)

التركيبية

لمبدا سيالوثرين10% وزن لحجم (100غ/ل).

Firme et fabrication :

Pays d'origine : Espagne par SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Báguena, 5 - 11
E-46009 VALENCIA (Espagne)
Tél.: +34 963 483 500

شركة الإنتاج : سيبكام اينافرا

بلد المنشأ: إسبانيا من طرف سيبكام اينافرا
الشارع استاذ بيلطران بكينا 5
فالانسيا - اسبانيا 46009
هاتف: 0034963483500

Importé par :

SARL DEVAGRI
CITE DU LYCEE J01
ROUIBA 16907
ALGER, ALGERIE
Tél./Fax : 023.96.23.81
Centre Antipoison d'Alger
Tél : 021.49.56.56/021.93.11.90/021.23.55.55

مستورد من طرف:

ديفريقي : ش.ذ.م.م
حي الشانوية ج 01 رويبة 16907
الجزائر
هاتف/فاكس: 023.96.23.81

مركز مكافحة التسمم لولاية الجزائر
رقم الهاتف: .49.56.56/021.93.11.90/021.23.55.55

CONTENU NET :

DATE DE FABRICATION : voir emballage
DUREE DE CONSERVATION : 2 ans
LOT DE FABRICATION N° : voir emballage

المقدار الصافي:

تاريخ الإنتاج: أنظر العبوة
مدة التخزين: سنتان
رقم الدفعة: أنظر العبوة

CHPPUA N° :


xxxxxx

رخصة مؤقتة للتسويق في الجزائر رقم:

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT D'OUVRIER L'EMBALLAGE

المرجو قراءة الملصق قبل فتح العبوة

PRÉCAUTIONS



- Nocif par inhalation
- Très toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets à long terme.
- Ne pas respirer la vapeur/l'aérosol.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Recueillir le produit répandu.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
- Conserver hors de portée des enfants
- Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux

CARACTÉRISTIQUES

Le produit **SPARVIERO** est un insecticide à base de Lambda-Cyhalothrine, matière active qui a un effet rapide contre de nombreuses espèces d'insectes, en agissant par contact, par ingestion et par effet répulsif.

APPLICATIONS/ MODE D'EMPLOI /DOSES/DELAI AVANT RÉCOLTE (DAR)

Appliquer par pulvérisation normale, en assurant une couverture homogène de la végétation. Ne pas dépasser les doses indiquées.

Cultures	Ravageurs	Dosage	DAR (Jour)
Agrumes	Cératite	10 à 20 ml/HL	7
Arbres fruitiers	Cératite, Tordeuse orientale (<i>Cydia molesta</i>), petite mineuse (<i>Anarsia lineatella</i>)	10 à 25 ml/HL	7
Olivier	Mouche de l'olivier (<i>Dacus oleae</i>)	10 à 20 ml/HL	7

PRÉCAUTIONS

- Ne pas traiter lors de floraison.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et des essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.) La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.